

1 Chestnut-sided white-eye



Zosterops mayottensis

ID: Songbird, yellow-olive, flanks brownish-orange, white ring around eyes. Song a melodious mellow whistling.

Where: Common in Dapani and Saziley, also parks and gardens.

Biology: Gregarious, forming small flocks for foraging in trees and shrubs. Nests mostly in October, open cups at 1 to 2 m in trees or shrubs. 3 to 4 eggs.

Similar: *Z. maderaspatana* in MADA, AN, MO. GC with endemic *Z. kirki*, *Z. mouroiensis* only at high elevations of Mt. Karthala.

Remarks: White-eyes are typical endemic inhabitants of oceanic islands across the Indo-pacific and adjacent continental areas of Africa, Asia, and Australia.



Zostérops de Mayotte

DE: Dotterbrust-Brillenvogel CM: Shilaputu

ID: Passereau, jaune-olive, flancs brun-orangé, contour des yeux blancs. Chant fait de sifflements mélodieux.

Habitat: Commun à Dapani et Saziley, aussi dans les parcs et jardins.

Biologie: Gregaire, forment de petits groupes se nourrissant dans les arbres et les buissons. Nids observés surtout en Octobre, en forme de bol ouvert à moyenne hauteur (env. 1 à 2 m) dans des arbres ou des buissons. 3 à 4 oeufs.

Ressemblance: *Z. maderaspatana* à MADA, AN, MO. GC avec les endémiques *Z. kirki*, *Z. mouroiensis* seulement aux hautes altitudes du Karthala.

Remarques: Les zostérops sont des endémiques typiques des îles indopacifiques et sur des zones continentales adjacentes d'Afrique, d'Asie, et d' Australie.



1



1

2 Mayotte sunbird



Cinnyris coquereli

ID: Songbird with curved beak. Male with bright yellow-orange belly, metallic green-blue head and back. Female drab greyish with light yellow belly. Harsh chipping calls and song.

Where: Rare in dense forests, more common at forest edge or in parks.

Biology: Mostly observed solitary. Feeds on nectar, also small invertebrates. Globular nests mostly seen in October at some m height on branches or in bamboo.

Similar: *C. humbloti* in GC, MO and *C. comorensis* in AN.

Remarks: This and similar species of smaller sunbirds form a lineage that colonized the WIO islands independently from the large species. Each one large and small species coexist in GC and MO.



Souimanga de Mayotte

DE: Mayotte-Nektarvogel CM: Mwanatsi

ID: Passereau au bec incurvé. Mâle avec des couleurs jaune et orange sur le ventre, bleu-vert métallique sur la tête et le dos. Femelle gris terne avec le ventre légèrement jaune. Chant sec et éclatant.

Habitat: Rare dans les forêts denses, plus commun en lisière ou dans les parcs.


Biologie: Souvent observé seul. Se nourrit de nectar, mais aussi de petits invertébrés. Nid sphérique observé en octobre à quelques mètres du sol sur les branches ou le bambou.

Ressemblance: *C. humbloti* à GC, MO et *C. comorensis* à AN.

Remarques: Les petits souimangas forment une lignée qui a colonisé les îles de l'Est de l'OI indépendamment des espèces plus grandes. Les grandes et petites espèces coexistent à GC et MO.



2



2



2

3 Starry ground gecko



Paroedura stellata

ID: Head triangular, clearly distinct from the neck. Tubercular scales. Color morphs: (3a) Brown with four brighter transversal bands on the back. (3b) More rarely almost black with bright white dots. Intermediates known. Juveniles (1c) darker with orange tails.

Where: Patchy distribution in or near natural habitats where house geckos are rare or absent.

Biology: Often active on the ground or on trunks of trees.

Similar: *P. sanctijohannis* (3d) endemic to GC, MO, AN, very similar to color morph (3a).



Gecko terrestre de Mayotte

DE: Mayotte-Bodengecko CM: Nkafiri

ID: Tête triangulaire, clairement distincte du cou. Ecailles tuberculeuses. Morphotypes: (3a) Marron avec 4 rangés transversales plus claires sur le dos. (3b) Plus rarement noir avec des points blancs. Intermédiaires possibles. Juvéniles (3c) plus sombre avec la queue orangée.

Habitat: Distribution irrégulière dans des habitats plutôt naturels où les geckos des maisons sont rares ou absents.

Biologie: Souvent actif sur le sol ou sur les troncs d'arbres.

Ressemblance: *P. sanctijohannis* (3d) endémique de GC, MO, AN, très similaire au morphotype (3a).



3a



3c



3b



4a

4 Comoran fish scale gecko

Geckolepis humbloti

ID: Robust. Greyish to brownish. Head not distinct from neck. Scales large and overlapping like those of a fish.

Where: Most common in dry and mesic forests, also on the islets of Mayotte. Mostly in lowlands, up to 700 m in AN. Also in the Bemaraha area of MADA.

Biology: Highly arboreal, sometimes found in pairs. Resting under bark at day.

Remarks: Sheds not only its tail, but also its scales to escape predators, then appearing naked (4a). Scales regrow.

Gecko à grandes écailles des Comores

DE: Komoren-Großschuppengecko CM: Nkafiri

ID: Trapu. Gris à marron. Tête non distincte du cou. Ecailles larges et chevauchantes comme celle d'un poisson.

Habitat: Plus commun dans les forêts sèches et mésiques, ainsi que sur les îlots de Mayotte. Trouvé à basse altitude et jusqu'à 700 m à AN. Présent aussi au Bemaraha à MADA.

Biologie: Arboricole, quelques fois par paire. Se cache sous les écorces en journée.

Remarques: Peut perdre, en plus de sa queue, ses écailles afin d'échapper à un prédateur, apparaît alors nu (4a). Les écailles repoussent.



3d



4



4



4

